



Southeastern Idaho Public Health

FOR IMMEDIATE RELEASE
June 3, 2020

Contact: Tracy McCulloch
(208)239-5250

Reuniones Sociales Tienen un Gran Impacto en Casos de COVID-19

Reuniones sociales son casusas comunes en el aumento de casos de COVID-19 en el sureste de Idaho. Con Idaho moviendo con las fases de reabrir, números permisibles para juntarse se han aumentado de 10 – 50 personas. Aunque, reuniones deben de hacerse de manera segura y eso quiere decir mantenerse por lo menos 6 pies de distancia e utilizar medidas de precaución como taparse la cara con un cubre bocas y proveer oportunidades para buena higiene de manos.

“Cuando se juntan con aquellos fuera de su hogar hay potencial de riesgo de difundir COVID-19,” dijo Maggie Mann, Directora de Southeastern Idaho Public Health (SIPH). “Practicando distancia física y usando cubre bocas de tela es el nuevo normal y debe ser practicado, aunque restricciones en Idaho este pasando las fases de re abrimiento.

COVID-19 es dos a tres veces más contagioso que la gripa, eso quiere decir que se puede pasar más rápido de una persona a otra. Individuos quienes pueden ser infectaos con COVID-19 que no tengan síntomas, o personas que se sientan completamente saludable y aun no se ha hecho prueba pueden difundir el virus sin saberlo.

“Siempre y cuando haiga personas en nuestra comunidad asintomática, contagio a otros continuará a ocurrir,” dijo Mann. Individuos asintomáticos pueden empeorar el redito de contagio e infección ahora, considerando que Idaho a comenzado a reabrir la mayoría de su economía.”

Con el potencial de vacuna proyectado aun muchos meses más lejanos, SIPH aun recomienda que individuos eviten reuniones en grupo. El aumento de casos de COVID-19 resalta la importancia de practicar las estrategias de reducción de riesgo los cuales incluyen:

- Quedarse en casa si está enfermo.
- Practicar distancia física (mantener por lo menos 6 pies ente individuos).
- Usar un cubre bocas de tela o mascarilla in lugares públicas en donde medidas de distancia física sea difícil de mantener.
- Cubrir su tos o estornudos con un pañuelo o con la manga de su ropa.
- Evada tocar sus ojos, nariz, y boca con manos no lavadas.
- Limpie y desinfecte frecuentemente objetos y superficies que son tocadas seguido.
- Lave sus manos seguido con jabón y agua por lo menos 20 segundos o use gel antibacterial.

Para más información sobre COVID-19 visite siphidaho.org o llame a la línea directa de Southeastern Idaho Public Health de lunes – viernes de 9:00 am – 4:30 pm al 208.234.5875. También puede vernos en vivo en Facebook lunes – viernes a las 11 am